

1	2	3	4	5
Xaloptic (Rp)	Latanoproszum	Krople do oczu, roztw.	0,05 mg/ml	1 but. 2,5 ml
	<p>Działanie: analog prostaglandyny F2 alfa, selektywny prostanoidowy agonista receptorów FP.</p> <p>Wskazania: zmniejszenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta oraz z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym.</p> <p>Dawkowanie: dorośli: 1 x dziennie po 1 kropli do worka spojówkowego, wieczorem.</p> <p>Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.</p> <p>Wytwórca: FAMAR S.A.; Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.</p>			
Zeldox (Rp)	Ziprasidonum	Zawies. doustna	10 mg	1 but. po: 60 i 240 ml
	<p>Działanie: lek przeciwpsychotyczny.</p> <p>Wskazania: leczenie schizofrenii. Leczenie epizodów manii lub epizodów mieszanych, o umiarkowanym nasileniu w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej.</p> <p>Dawkowanie: zalecana dawka: 2 x na dobę po 40 mg; może być zwiększona maksym. do 2 x na dobę po 80 mg. Największa zalecana dawka może być stosowana już od 3 doby leczenia. W leczeniu podtrzymującym stosować najmniejszą skuteczną dawkę; w wielu przypadkach dawka 2 x na dobę po 20 mg jest wystarczająca.</p> <p>Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Polska Sp. z o.o.</p> <p>Wytwórca: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH.</p>			

Powyższy wykaz został opracowany na podstawie danych URPLWMIpB; obecność leku na liście nie jest równoznaczna z fizyczną jego obecnością w aptece i/lub hurtowni farmaceutycznej.

Bliższych informacji zarówno o leku, jak i sposobie jego dystrybucji może udzielić jedynie wytwórca lub podmiot odpowiedzialny. Szczegółowy opis surowców farmaceutycznych (monografie) znajdują się w FPV.

Oznaczenia: **Rp** – środek farmaceutyczny wydawany z apteki na podstawie recepty,

Rpw – leki wydawane z apteki na podstawie recepty, zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe

RpZ – leki wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania

Lz – przeznaczony do stosowania wyłącznie w lecznictwie zamkniętym,

OTC – leki wydawane bez recepty.

Opr. Anna Matyja

NOWOŚĆ - leczy blizny stare i nowe

Kelo-cote® - oryginalna formuła
żelu silikonowego do leczenia blizn.

Skuteczność potwierdzona
badaniami medycznymi
www.kelo-cote.pl

Bezpieczeństwo
badania
tolerancyjności

Wygoda w aplikacji
szybko wysycha



Żel 6g, 15g, Spray 50 ml, 100 ml,
dostępne w aptekach

www.EKOPHARM.pl - tel: 0 (22) 389 7585,

Innowacyjna Opatentowana Formuła Silikonu Advanced Bio-Technologies. USA.

► NOWY PREPARAT

Skład: preparat zawiera polisiloksan i dwutlenek krzemu.

Działanie: formuła silikonu w preparacie spłaszcza, zmiękcza i wygładza blizny, łagodzi świąd i uczucie dyskomfortu oraz zmniejsza stopień odbarwienia skóry w miejscu blizny. Żel wpływa na normalizację produkcji kolagenu.

Wskazania: leczenie wszystkich rodzajów blizn: pooperacyjnych, pooparzeniowych, pourazowych, potrądzikowych, po cesarskim cięciu.

Sposób użycia: bardzo cienką warstwę żelu nałożyć i pozostawić do wyschnięcia przez 4-5 min. Stosować 2x dziennie. Preparat można stosować pod odzież uciskową – wtedy stosować 1 x dziennie. Nie stosować na uszkodzoną skórę.

Kelo-cote®
żel silikonowy do leczenia blizn;
opak. 6 i 15 mg
OTC



✓ EKOPHARM – DYSTRYBUTOR ABT
ADVANCED BIO-TECHNOLOGIES, INC. USA

► NOWY PREPARAT

Skład: preparat zawiera polisiloksan i dwutlenek krzemu.

Działanie: formuła silikonu w preparacie spłaszcza, zmiękcza i wygładza blizny, łagodzi świąd i uczucie dyskomfortu oraz zmniejsza stopień odbarwienia skóry w miejscu blizny.

Wskazania: leczenie wszystkich rodzajów blizn: pooperacyjnych, pooparzeniowych, pourazowych, potrądzikowych, po cesarskim cięciu.

Sposób użycia: spryskiwać umytą i wysuszoną powierzchnię blizny z odległości 15-20 cm w ciągu 1-2 sek. Pozostawić do wyschnięcia przez 2-3 min. Stosować 2 x dziennie. Preparat można stosować pod odzież uciskową; nie stosować na uszkodzoną skórę.

Kelo-cote Spray®
spray silikonowy do leczenia blizn;
opak. 50 i 100 ml
OTC



EKOPHARM – DYSTRYBUTOR ABT
ADVANCED BIO-TECHNOLOGIES, INC. USA

► NOWY PREPARAT

Skład: w 1 zestawie (28 szt.): 2 tabl. ciemnożółte: 3 mg walerianianu estradiolu; 5 tabl. czerwonych: 2 mg walerianianu estradiolu i 2 mg dienogestu; 17 tabl. jasnożółtych: 2 mg walerianianu estradiolu i 3 mg dienogestu; 2 tabl. ciemnoczerwone: 1mg walerianianu estradiolu; 2 tabl. białe: bez skł. aktywnych.

Działanie: dwuskładnikowy, pięcioletni preparat antykoncepcyjny.

Wskazania: antykoncepcja hormonalna.

Dawkowanie: 1 x dziennie o tej samej porze przez 28 dni. Szczegółowe dawkowanie patrz informacja producenta.

Qlaira
tabl. powł.; opak. po: 28, 84
i 168 szt.
Rp

BAYER SCHERING PHARMA

W krajach Unii Europejskiej (Francja, Niemcy, Anglia, Holandia, Włochy) preparaty zawierające ornitynę, przeznaczone do podawania doustnego, posiadają status suplementów diety, a zalecane dawki nie przekraczają 1,5 g/dobę

suplementacja matymi dawkami ornityny może wywierać długotrwały ochronny efekt zapobiegając różnym formom hiperamonemii. Ponadto nadmiar ornityny jest metabolizowany do poliamin i proliny, co wspiera regenerację wątroby.

Suplementacja ornityny wydaje się być szczególnie korzystna w niektórych sytuacjach stresowych takich, jak: nadmierny wysiłek fizyczny, niewydolność wątroby, krwawienie z przewo-

du pokarmowego, niedożywienie, uraz, a także okres wzrostu, gdy dochodzi do nadmiernej produkcji amoniaku, co powoduje relatywny niedobór ornityny i argininy [39,40].

Asparaginin ornityny podawany osobom niedożywionym przed lub w trakcie posiłku bogatego w proteiny ułatwia utrzymanie prawidłowego balansu azoty w ustroju, co ułatwia odniesienie korzyści, wynikających ze stosowania bogatoproteinowej diety.

W krajach Unii Europejskiej (Francja, Niemcy, Anglia, Holandia, Włochy) preparaty zawierające ornitynę, przeznaczone do podawania doustnego, posiadają status suplementów diety, a zalecane dawki nie przekraczają 1,5 g/dobę. Do głównych zastosowań takich suplementów należy: wspomaganie procesów detoksykacyjnych wątroby, niedożywienie, podeszły wiek czy okres rekonwalescencji.

W większych dawkach (do 40 g/d) ornityna wywiera efekt leczniczy. Biorąc pod uwagę mechanizm działania, asparaginin ornityny znalazł zastosowanie w leczeniu niewydolności wątroby z encefalopatią lub śpiączką wątrobową, której przyczyną jest hiperamonemia. W takich przypadkach stosowano wysokie dożyłne dawki leku (20-40 g/dobę) [35], uzyskując zmniejszenie hiperamonemii i poprawę sprawności umysłowej [21,41].

Podsumowanie i wnioski

Jak wykazano w wielu doświadczalnych i klinicznych badaniach w ostatnich latach, niektóre aminokwasy odgrywają istotną rolę jako modulatory odpowiedzi metabolicznej na stres. Ornityna odgrywa kluczową rolę w cyklu mocznikowym, regulując detoksykację organizmu poprzez redukcję poziomu amoniaku, który przekształcany jest w mniej toksyczny mocznik, następnie wydalany przez nerki. Ornityna często jest łączona z asparagininem jako dodatkowym nośnikiem azotu. Suplementacja asparagininem ornityny nasila wydalanie amoniaku w cyklu mocznikowym, co potwierdzono w wielu badaniach klinicznych.

Wyniki badań klinicznych wskazują również na potencjalne właściwości ornityny takie, jak wspomaganie proliferacji i regeneracji tkanek. Suplementacja ornityny może być korzystna u osób w okresie rekonwalescencji oraz u osób w wieku podeszłym. Ornityna przyspiesza także proces gojenia u pacjentów po oparzeniach oraz wspomaga wzrost u dzie-

NOWOŚĆ - leczy blizny stare i nowe

Kelo-cote® - oryginalna formuła
żelu silikonowego do leczenia blizn.

Skuteczność potwierdzona
badaniami medycznymi
www.kelo-cote.pl

Bezpieczeństwo
badania
tolerancyjnośc

Wygoda w aplikacji
szybko wysycha



Żel 6g, 15g, Spray 50 ml, 100 ml,
dostępne w aptekach

www.EKOPHARM.pl - tel: 0 (22) 389 7585,

Innowacyjna Opatentowana Formuła Silikonu Advanced Bio-Technologies. USA.